CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis.

O Calendário Nacional de Vacinação pode ajudar a descobrir quais vacinas seu filho precisa e quando. As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde – SUS são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais.



IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG	Única	Formas graves da tuberculose
	Hepatite B	Única	Hepatite B
2 meses	Penta	1ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas por Haemophilus influenzae B
	VIP (Poliomielite)	1ª dose	Poliomielite
	VPC10 (Pneumocócica)	1ª dose	Doenças pneumocócicas invasivas
	VORH (Rotavírus)	1ª dose	Gastrenterite viral
3 meses	Men C (Meningocócica C)	1ª dose	Doença meningocócica
4 meses	Penta	2ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas por Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas por Haemophilus influenzae B
	VIP (Poliomielite)	2ª dose	Poliomielite
	VPC10 (Pneumocócica)	2ª dose	Doenças pneumocócicas invasivas
	VORH (Rotavírus)	2ª dose	Gastrenterite viral
5 meses	Men C (Meningocócica C)	2ª dose	Doença meningocócica
6 meses	Penta	3ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas por Haemophilus influenzae B
	VIP (Poliomielite)	3ª dose	Poliomielite
	INF3 (Influenza)	1ª dose	Gripe (Influenza)
	Covid-19	1ª dose	As formas graves e complicações pela covid-19
	6 e 7 meses) para a vacina Spikevax criança não inicie ou complete o eso dias, seguindo o histórico vacinal e o	(Moderna) e três doses (a quema até os 9 meses, a v os intervalos mínimos de «	Nacional da Criança, com esquema de duas doses (aos aos 6, 7 e 9 meses) para a Comirnaty® (Pfizer). Caso a vacinação pode ser feita até os 4 anos, 11 meses e 29 4 semanas entre a 1ª e 2ª dose e 8 semanas entre a 2ª e uema de três doses aos 6, 7 e 9 meses.

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS	
7 meses	Covid-19	2ª dose	As formas graves e complicações pela covid-19	
	Obs.: A vacina contra a Covid-19 está incluída no Calendário Nacional da Criança, com esquema de duas doses (aos 6 e 7 meses) para a vacina Spikevax (Moderna) e três doses (aos 6, 7 e 9 meses) para a Comirnaty® (Pfizer). Caso a criança não inicie ou complete o esquema até os 9 meses, a vacinação pode ser feita até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, seguindo o histórico vacinal e os intervalos mínimos de 4 semanas entre a 1ª e 2ª dose e 8 semanas entre a 2ª e 3ª. Para crianças imunocomprometidas, recomenda-se o esquema de três doses aos 6, 7 e 9 meses.			
9 meses	Covid-19	3ª dose	As formas graves e complicações pela covid-19	
	Obs. : A vacina contra a Covid-19 está incluída no Calendário Nacional da Criança, com esquema de duas doses (aos 6 e 7 meses) para a vacina Spikevax (Moderna) e três doses (aos 6, 7 e 9 meses) para a Comirnaty® (Pfizer). Caso a criança não inicie ou complete o esquema até os 9 meses, a vacinação pode ser feita até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, seguindo o histórico vacinal e os intervalos mínimos de 4 semanas entre a 1ª e 2ª dose e 8 semanas entre a 2ª e 3ª. Para crianças imunocomprometidas, recomenda-se o esquema de três doses aos 6, 7 e 9 meses.			
	Febre Amarela	1ª dose	Febre Amarela	
12 meses	Vacina VPC10 (Pneumocócica)	Reforço	Doenças pneumocócicas invasivas	
	Men C (Meningocócica C)	Reforço	Doença meningocócica	
	SCR (Tríplice viral)	Única	Sarampo, Caxumba e Rubéola	
15 meses	VIP (Poliomielite)	Reforço	Poliomielite	
	SCRV (Tetraviral)	Única	Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela	
	Hepatite A	Única	Hepatite A	
	DTP (Tríplice bacteriana)	1º Reforço	Difteria, Tétano, Coqueluche	
4 anos	Febre Amarela	Reforço	Febre Amarela	
	DTP (Tríplice bacteriana)	2º Reforço	Difteria, Tétano, Coqueluche	
	Varicela	Única	Varicela	
9 e 14 anos	HPV4	Única	Infecções por Papilomavírus Humano	



